NOMBRE: _____ **FECHA:** _____ **MD:** _____

IMPRESIÓN GLOBAL TRANSDIAGNÓSTICA - PSICOPATOLOGÍA

PARTE I.

El TGI-P se valora en una escala de 7 puntos, utilizando un rango de respuestas desde 1 (normal) hasta 7 (gravedad extrema).

Después o durante la visita, por favor valore la gravedad de los síntomas teniendo en cuenta su experiencia clínica total con los pacientes:

	Normal	Mínimo	Leve	Moderado	Marcado	Grave	Extremo
1. Síntomas **positivos**	1	2	3	4	5	6	7
Delirios, alucinaciones, pensamiento y habla desorganizados, así como comportamiento motor anormal							
2. Síntomas **negativos**	1	2	3	4	5	6	7
Embotamiento, alogia, asocialidad, avolición y anhedonia							
3. Síntomas **maníacos**	1	2	3	4	5	6	7
Grandiosidad, pensamientos acelerados, distracción y participación excesiva en actividades placenteras							
4. Síntomas **depresivos**	1	2	3	4	5	6	7
Bajo estado de ánimo, sentimiento persistente de tristeza, desesperanza e impotencia							
5. Síntomas de **adicción**	1	2	3	4	5	6	7
Deterioro del control, deseo y dependencia física							
6. Síntomas **cognitivos**	1	2	3	4	5	6	7
Problemas de concentración, atención y memoria							
7. Síntomas de ansiedad	1	2	3	4	5	6	7
Inquietud, nerviosismo o tensión							
8. Síntomas de **sueño**	1	2	3	4	5	6	7
Somnolencia diurna excesiva o lo contrario, insomnio							
9. Síntomas de **hostilidad**	1	2	3	4	5	6	7
Ira, tensión, falta de cooperación, impulsividad y agresión							
10. Síntomas de autolesión	1	2	3	4	5	6	7
Autolesión no suicida, ideación suicida, intención, intento							

PARTE II.

Para elaborar la huella TGI-P, inserte las puntuaciones en los círculos. Primero, elija una línea de síntoma y, a continuación, ponga un punto donde la línea cruce el círculo con la gravedad adecuada. Después de puntuar cada síntoma, conecte los puntos para obtener una huella de síntomas. Utilice el TGI-P en cada visita para comparar los cambios y comprender mejor la evolución del tratamiento.